

# Fièvre catarrhale ovine F.C.O

01

## Description

- Maladie **infectieuse virale des Ruminants**
- Transmise par les **insectes hématophages** (culicoïdes)
- Existe sous **24 sérotypes différents**
- **Sérotipe 8** dans le Sud de la France et Massif Central
- **Sérotipe 3** aux Pays Bas, Belgique, Allemagne, Grande Bretagne et France

02

## Symptômes

- Se manifestent les 4 à 20 jours suivant l'infection


### Ovins:

- **Fièvre**
- **Hypersalivation**
- **Œdèmes buccaux**
- Boiteries
- Ulcères nasaux
- Symptômes pulmonaires
- Mort brutale
- Langue bleue

### Bovins:

- **Hypersalivation**
- **Fièvre**
- **Boiteries**
- Oedèmes jarrets et bucaux
- symptômes oculaires
- irritation du mufle
- congestion buccale

**Caprins:** évolue de manière **latente** (sans symptômes visibles)



04

## Que faire en prévention?

- **Vigilant** à l'apparition de **signes cliniques** et faire appel au vétérinaire au moindre doute
- Désinsectiser les **ruminants**, les **locaux** d'élevages et les **bétaillères**
- **Limiter les zones d'habitat des moucheron** (Milieu humide enrichis de substance organique: boue fumier)
- **Respecter les règles de mouvements**
- **Vaccination**

03

## Transmission

- **Insectes hématophages** peuvent **aspire le virus** lors d'un repas sanguin, ensuite le virus se développe dans l'organisme de l'insecte et **peut être transmis après environ une semaine à un autre ruminant**
- Les **moucheron** sont les vecteurs de la FCO, ils sont **très actifs entre crépuscule et l'aube**

