

Maladie d'Aujeszky

01

Description

- Maladie **virale très contagieuse** provoquée par l'Herpès virus porcin 1
- **D'autres espèces** (chiens, chats et ruminants) **peuvent être infectées** et développer la maladie mais **ne sont pas à même de la transmettre** (hôte cul-de-sac)
- **Pas transmissible à l'Homme**

02

Transmission

- Excrétion du virus dans la **salive, les sécrétions nasales et génitales**
- Le **lait, les cadavres, abats et la viande de suidés contaminés** représentent également des **sources de matières virulentes**.
- La **contamination** peut se faire par **voie aérogène** (contact rapproché avec un porc ou un sanglier infecté), par **l'intermédiaire de matériel contaminé** ou par **contact avec de la viande de porc contaminée ou des cadavres de sangliers contaminés**

03

Symptômes

Très variables

- Perte d'appétit (reproducteurs)
- Fièvre (reproducteurs)
- Troubles de la reproduction (reproducteurs)
- Troubles respiratoires (reproducteurs et charcutiers)
- Retards de croissance (reproducteurs et charcutiers)
- Symptômes nerveux (porcelets)

Taux de mortalité variable

- 100% chez les porcelets de moins de 2 semaines
- à moins de 2% dans une population adulte

05

Que faire en prévention?

- La **France** est **indemne**, toutefois la **maladie circule chez les sangliers sauvages**
- Mesures de **biosécurité** des **porcs élevés en plein air** vis-à-vis des sangliers
- Une surveillance par des **dépistages sérologiques annuels** dans les élevages de reproducteurs et dans les élevages plein air est obligatoire.

04

Lutte contre la maladie

- **Pas de traitement spécifique**
- **Maladie réglementée** (rang I) faisant l'objet de mesures de police sanitaire
- En cas de **confirmation de la maladie**, les **porcs** du cheptel foyer sont **abattus**
- **Abattages et vide sanitaire**
- **Dépistage des cheptels voisins**