

Fièvre catarrhale ovine

F.C.O

01

Description

- Maladie **infectieuse virale des Ruminants**
- Transmise par **des moucheron** (Culicoïdes)
- Existe sous **24 sérotypes différents**:

-8 dans le sud de la France et Massif Central
-3 aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Grande Bretagne

02

Symptômes

- Dans les 4 à 20 jours suivant l'infection, parfois **inaperçus**


Ovins:

- **Fièvre**
- **Hypersalivation**
- **Œdèmes buccaux**
- **Avortements**
- Boiteries
- Ulcères nasaux
- Symptômes pulmonaires
- Mort brutale
- Langue bleue

Bovins:

- **Hypersalivation**
- **Fièvre**
- **Boiteries**
- **Avortements**
- Oedèmes jarrets et bucaux
- Symptômes oculaires
- Irritation du mufler
- Congestion buccale

Caprins: évolue de manière **latente** (sans symptômes visibles)



04

Que faire en prévention?

- **Vigilant** à l'apparition de **signes cliniques** et faire appel au vétérinaire au moindre doute.
- Désinsectiser les **ruminants**, les **locaux** d'élevages et les **bétaillères**.
- **Limiter les zones d'habitat des moucheron** (Milieu humide enrichis de substance organique: boue, fumier).
- **Respecter les règles de mouvements**.
- **Vaccination**

03

Transmission

- **Insectes hématophages = moucheron** peuvent **aspirer le virus** lors d'un repas sanguin, ensuite le virus se développe dans l'organisme de l'insecte et **peut être transmis après environ une semaine à un autre ruminant**.
- Les **moucheron** sont **très actifs** entre le crépuscule et l'aube.

